


## 44. Iza Zaliwska

Ampelografia  
B. Sękowski & R. Myśliwiec



Mieszaniec *Vitis labrusca* i *Vitis vinifera*



**Pochodzenie:** siewka znaleziona przez Stanisława Zaliwskiego około roku 1945 w Puławach. Dzisiejsza polska nazwa została nadana przez B. Sękowskiego.

### CECHY MORFOLOGICZNE

#### Roślina

**Koronka:** obustronnie żółtawoszara, kutnerowata, z licznymi, brązowymi włoskami. Przylistki wczesnie zamierające, brązowo owłosione.

**Listki podkoronkowe:** zielonożółte, ku brzegowi nieco bardziej żółte, z wierzchu matowe, nieco owłosione, spodem jaśniejsze, żółtawozielone, kutnerowate, nerwy wyraźnie owłosione.

**Liście dojrzałe:** małe lub średnie, prawie zawsze wyraźnie i głęboko 5-klapowe, w zarysie pięciokątne. Kłapy szerokie, krótkie o szczytach wyraźnie zaokrąglonych. Spód liścia szarozielony, krótko kutnerowaty. Liść raczej płaski, podobny do odmiany Seneca, ale regularniej i głębiej wycinany.

**Ząbki:** średniej wielkości lub małe, brzeg blaszek raczej ząbkowany jak piłkowany.

**Zatoka ogonkowa:** raczej otwarta, wąska, o wąskim, eliptycznym dnie (czasem zamknięta z prześwitem).

**Zatoki górne:** głębokie, otwarte, sięgające od 1/3 do 3/4 długości nerwu głównego, na dnie zaokrąglone, ale zawsze bez ząbka, U-kształtne. Zatoki dolne szeroko otwarte, U-kształtne, ale mniejsze niż górne. Nerwy jasnozielone, prawie nagie (mniej owłosione niż spód blaszki).

**Ogonek:** zielony, gruby, prawie nagi, często z czerwonymi prążkami, dłuższy od nerwu środkowego.

**Wąsy:** słabe lub średnie, jeśli nie czepiają się podpór, bardzo szybko opadają, ale są przeważnie ułożone według układu *Vinifera*. Pierwsze wąsy pojawiają się na 3–7 węzle latorośli. Pierwsza latorośl płodna pojawia się zwykle na dalszych węzłach łoży, rzadziej na 2–3.

**Latorośl:** o międzywęzłach średniej długości, zielona, prawie naga, bruzdowana, często z czerwonymi prążkami.

#### Owoce

**Grona:** średniej wielkości, stożkowate, średnio zwarte.

**Jagody:** średniej wielkości lub małe, zielonawe, kuliste, o zapachu *Labrusca*, słodkie, z 1–2 nasionami, półsoczyste (częściowo galaretowate), jadalne przed całkowitym dojrzaniem.

### FENOLOGIA I CECHY GOSPODARCZE

**Wzrost:** zaledwie średni.

**Cięcie:** długie.

**Plenność:** mniej niż średnia lub średnia (w polu), pod osłonami niekiedy bardzo wysoka.

**Pora dojrzewania:** 08/09–08/20, czasem wcześniej, po 120 dniach wegetacji (2100°C SAT), ale gdy jest cieplej odmiana lepiej plonuje i wcześniej dojrzewa.

**Odporność na mrozy:** (VI) — dość odporna.

**Odporność na choroby:** dość odporna, jednak na roślinach i owocach obserwowano mączniaka rzekomego (liście — I, owoce — 3–5) — średni lub dość duży stopień porażenia.

**Termin przebarwiania i zrzuwania liści:** liście jesienią intensywnie żółte, późno opadają (około 10 listopada).

**Przydatność odmiany:** odmiana dobra na własny użytek. Dobrze rodzi na glebach żyznych i ciepłych. Według S. Żyły (Poznań) pod folią bardzo płodna. Jedna z niewielu odmian polskich. Amatorska.