

I vitigni resistenti

Fleurtaï b.



Germogliamento: 16 marzo

Fioritura: 2 giugno

Invaiaura: 28 luglio

Maturazione: 24 agosto

Vigoria: elevata



Resistenza malattie		
Peronospora	Oidio	Botrite
Ottima	Ottima	Ottima

Grappoli (n.)	Gemme tot (n.)	Gemme germogliate (n)	Produzione di uva per ceppo (kg)	Peso grappolo (g)	Peso acino (g)	Legno potatura (kg)
17,56	12,60	10,74	3,086	175	1,82	1,459

Valori medi (anni 2019-2021)

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio

ARSIAL




**REGIONE
LAZIO**


I vitigni resistenti

Fleurtaï b.

Curve di maturazione



Acidità totale (g/L espressi in acido tartarico)



Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

ARSIAL

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



REGIONE
LAZIO

I vitigni resistenti

Analisi sensoriale vini vitigni a bacca bianca



Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia



Fleurtai b.

Dati medi di 3 annualità (2019-2020-2021) rilevati con assaggio anonimo del vino con scheda OIV (Risoluzione ECO 332A/2009) e normalizzati a 100

ARSIAL

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



**REGIONE
LAZIO**